


# Coronavirus

---

Definiciones y cómo proceder



# Posibles escenarios de caso sospechoso

## Escenario 1



Enfermedad respiratoria aguda



Fiebre sobre 37,8°C o síntoma de enfermedad respiratoria



Historial de viaje o contacto

## Escenario 2



Enfermedad respiratoria aguda




Haber estado en contacto con un caso confirmado los 14 días previos al inicio de los síntomas.

## Escenario 3



Infección respiratoria aguda



Fiebre sobre 37,8°C




Dolor de garganta

## Escenario 4



Infección respiratoria aguda



Fiebre sobre 37,8°C




Dolores musculares

## Escenario 5



Infección respiratoria aguda



Fiebre sobre 37,8°C



Tos



Médico evaluará y confirmará si uno de estos posibles escenarios es un caso sospechoso.


# Clasificación de riesgo de los contactos

## Contactos de alto riesgo

- ☼ Persona que brinda atención directa sin el equipo de protección personal (EPP) adecuado a casos confirmados con COVID-19 entre de 2 días antes al inicio de síntomas y 14 días después al inicio de síntomas.

### ☼ **Contacto estrecho**

Persona en contacto con un caso confirmado con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo, en los siguientes contextos:



Más de 15 minutos de contacto cara a cara (a menos de un metro).



Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más.



Vivir en el mismo hogar o haber pernoctado en lugares de tránsito como hoteles, entre otros.



Trasladarse en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro con otro pasajero y sin equipo de protección personal (epp).

- ☼ Viajeros provenientes del extranjero, independiente del país de origen, se manejarán como contacto de alto riesgo.

# ¿Cómo proceder al detectar un caso sospechoso?

## Aplicar protocolos según corresponda

### ¿Qué hacer en caso de que un trabajador presente síntomas durante la jornada de trabajo?

- Llamar al policlinico más cercano e informar que trasladará a un trabajador con síntomas de Coronavirus.
- Llamar de inmediato al trabajador al policlinico utilizando ambos anteojos sellados de seguridad y su elemento de protección respiratoria. El trabajador debe ir sentado en el asiento trasero derecho de la camioneta, en diagonal al asiento del chofer.
- El equipo médico determinará si es o no un caso sospechoso.
- En caso de que equipo médico determine que es un caso sospechoso, el supervisor ROL A directo DET o Adm. de Contrato, quien deberá informar de inmediato a la DSO (Dirección de Salud Ocupacional DET), el listado completo de trabajadores en contacto en el turno, en camarines, en casino y en bus.
- A partir de la determinación de caso sospechoso el trabajador queda a disposición del equipo médico.
- Los trabajadores en "contacto" deben trasladarse de inmediato a sus domicilios para realizar aislamiento preventivo, el médico Jefe de la Unidad de Salud Ocupacional tomará contacto para hacer seguimiento médico del caso.
- El médico Jefe de la Unidad de Salud Ocupacional es el único autorizado para dar el alta médica de un trabajador que ha estado en aislamiento preventivo.

Trabajador con síntomas durante la jornada de trabajo

### ¿Qué hacer en caso de que un trabajador presente síntomas fuera de la jornada de trabajo?

- Los trabajadores deben acudir al servicio de urgencia correspondiente según su sistema previsional.
- El equipo médico determinará si es o no un caso sospechoso.
- En caso de que equipo médico determine que es un caso sospechoso, comuníquese de inmediato a su supervisor ROL A directo DET o Adm. de Contrato, quien deberá informar de inmediato a la DSO (Dirección de Salud Ocupacional DET), el listado completo de trabajadores en contacto en el turno inmediatamente anterior, en camarines, casino y bus.
- Los trabajadores en "contacto" deben trasladarse de inmediato a sus domicilios para realizar aislamiento preventivo, el médico Jefe de la Unidad de Salud Ocupacional tomará contacto para hacer seguimiento médico del caso.
- El médico Jefe de la Unidad de Salud Ocupacional es el único autorizado para dar el alta médica de un trabajador que ha estado en aislamiento preventivo.

Trabajador con síntomas fuera de la jornada de trabajo

### ¿Qué hacer en caso de que un trabajador presente síntomas en el trayecto de bus?

- Chofer debe detener el bus y comunicar vía radiat a su área de tráfico que trasladó a un trabajador con síntomas de Coronavirus.
- El área de tráfico debe llamar al Médico Regulador Policlinico Colón.
- Médico Regulador designa ambulancia más cercana al punto de detención e informa al Jefe de Unidad de Salud Ocupacional de la
- El trabajador con síntomas se trasladará en ambulancia a policlinico, al Hospital Clínico FUSAT o a la Red Asistencial Pública según sea el caso.
- Chofer procede a identificar todos los pasajeros, especialmente a aquellos que están ubicados a dos filas delante y dos filas detrás del trabajador con síntomas.
- Los trabajadores en "contacto" deben trasladarse de inmediato a sus domicilios para realizar aislamiento preventivo, el médico Jefe de la Unidad de Salud Ocupacional tomará contacto para hacer seguimiento médico del caso.
- El médico Jefe de la Unidad de Salud Ocupacional es el único autorizado para dar el alta médica de un trabajador que ha estado en aislamiento preventivo.

Trabajador con síntomas en el trayecto de bus

**El Médico GSSO debe:**

Orientar el proceso desde la detección del sospechoso hasta que todos los contactos de alto riesgo se encuentren en aislamiento preventivo.

Monitorear en conjunto con su equipo el estado de salud de todos los trabajadores involucrados en este proceso.

**Al detectar un trabajador "Sospechoso", el supervisor ROL A directo DET o Adm. de contrato debe:**

Realizar un levantamiento de todos los trabajadores catalogados como **contactos de Alto Riesgo**

Enviar a cuarentena preventiva, a los contactos de Alto Riesgo hasta confirmación o descarte de caso sospechoso. ●

Enviar listado de casos de Alto Riesgo a Médico GSSO

Solicitar listado a GSYS

La GSYS entrega información asociada a la ubicación de los trabajadores en contacto con caso sospechoso en los servicios de transporte y casino.

- En caso de descartar el caso sospechoso, el trabajador debe volver a sus funciones normales

# ¿Qué se debe hacer en cada caso?

## Acciones según categoría

### **Contactos de ALTO Riesgo (incluye contactos estrechos):**

Se aplicaran las siguientes medidas:

- 1** Seguimiento, monitorización y orientación telefónica.
- 2** Aislamiento preventivo por 14 días.
- 3** **No corresponde PCR Coronavirus -COVID 19.**

### **Contactos de BAJO Riesgo:**

- 1** En caso de contacto de bajo riesgo no se aplicará seguimiento.
- 2** Solo debe cumplir las medidas generales de distanciamiento social e higiene.

### **Coso SOSPECHOSO:**

Se aplicaran las siguientes medidas:

- 1** Evaluación médica.
- 2** Seguimiento, monitorización y orientación telefónica.
- 3** PCR Coronavirus -COVID 19 según indicación Médica.
- 4** Aislamiento preventivo hasta confirmar o descartar COVID 19